

Savulin® 500 mg filmtabletta

A Savulin® levofloxacin hatóanyagú, 3. generációs légúti fluorokinolon, **széles spektrumú antibiotikum**, ami a DNS-DNS-giráz komplexen és a topoizomeráz IV-en fejt ki hatását.

Jelentős szöveti penetráció jellemzi: penetrál a bronchialis nyálkahártyába, az epithelialis folyadékteregbe, az alveolaris makrofágokba, a tüdőszövetbe, a bőrbe (hólyagnedv), a prosztataszövetbe és a vizeletbe.

Felnőttek kezelésére javallt az alábbi indikációkban, a jelzett ideig, amikor az egyéb antibakteriális szerek nem tekinthetők megfelelőnek:

Javallatok	Napi adagolás (a kórkép súlyosságától függően)	A kezelés időtartama (a kórkép súlyosságától függően)
Akut bakteriális sinusitis	500 mg naponta 1-szer	10-14 nap
Krónikus obstruktív tüdőbetegség – a krónikus bronchitist is beleértve – akut exacerbációja	500 mg naponta 1-szer	7-10 nap
Területen szerzett pneumonia	500 mg naponta 1-szer vagy 2-szer	7-14 nap
Akut pyelonephritis	500 mg naponta 1-szer	7-10 nap
Szövődménymentes cystitis	250 mg naponta 1-szer	3 nap
Szövődményes húgyúti infekciók	500 mg naponta 1-szer	7-14 nap
Krónikus bakteriális prostatitis	500 mg naponta 1-szer	28 nap
Szövődményes bőr- és lágyrészfertőzések	500 mg naponta 1-szer vagy 2-szer	7-14 nap
Anthrax-inhaláció: posztexpozíciós követő profilaxis és terápia	500 mg naponta egyszer	8 hét

A levofloxacinok esetén a parenterális, ill. az orális gyógyszerforma bioekvivalens. Per os bevételt követően a **plazma csúcskoncentráció 1-2 órán belül** kialakul.

A Savulin®-t naponta egy vagy két alkalommal kell bevenni, **az étkezéstől függetlenül**, bármikor, egészben, szétrágás nélkül, megfelelő mennyiségű folyadékkal. Vas-sók, cink-sók, magnézium/alumínium-tartalmú savlekötők, vagy didanozin és szukralfát alkalmazása előtt vagy után legalább két órával kell bevenni, mivel ezek a felszívódást csökkenthetik.

A tablettát a közepén lévő bemetszés mentén két egyenlő adagra osztható. A Savulin® filmtabletta **laktózmentes**.

Ellenjavallatok:

- kinolonnal vagy a készítmény segédanyagaival szembeni túlérzékenység
- epilepszia
- fluorokinolonok adásával összefüggésbe hozható ínbetegségek az előzményben
- gyermekek, növében lévő serdülők
- terhesség, szoptatás (FDA terhességi kategória: C).

Gyakori mellékhatások: álmatlanság, fejfájás, szédülés, gastrointestinális panaszok, májenzimek emelkedése.

A forgalomban lévő gyógyszerek esetén a feltételezett mellékhatások bejelentése fontos eszköz a gyógyszer előny/kockázat profiljának meghatározásához és folyamatos nyomonkövetéséhez. Kérjük, amennyiben mellékhatást észlel, Ön is jelentse azt Gyógyszerbiztonsági Osztályunk felé: +36 1 505 7032, drugsafety@richter.hu.

Farmakovigilanciái tevékenységünk betegek biztonságát és az Ön gyógyító munkájának további sikerességét szolgálja.

Köszönjük, hogy termékünket megtisztelti bizalmával!



Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.

A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformatio@richter.hu címen érdeklődhet. Document ID: KEDP/DAEBHZ, Lezárás dátuma: 2021.07.27.



Savulin® 500 mg filmtabletta (5x)
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=32002
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2020.12.07.
Teljes ár/TB támogatás/Téritési díj: 1389 Ft/337 Ft/1052 Ft



Savulin® 500 mg filmtabletta (7x)
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=32002
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2020.12.07.
Teljes ár/TB támogatás/Téritési díj: 1945 Ft/471 Ft/1474 Ft